

- Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.

- Los efectos secundarios pueden aparecer a las pocas horas e incluso hasta una semana posterior a la colocación de la vacuna.

- La persona vacunada debe ingerir abundante líquido.
- Coloque compresas frías (no congeladas) en la zona de punción para ayudar a aliviar el dolor que pudiese presentar.
- En caso de fiebre (temperatura superior a 37,5 °C), administrar antipirético recomendado por su médico tratante.

Apellidos: Hurtado Cortés

Institución o empresa: Facultad

HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE

Lunes a viernes entre las 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 16:30 horas

Teléfono: 22978 8822 - Email: vacunatorio@hcuch.cl
Santos Dumont 999, Independencia, 1^{er} piso, sector B

Santos Dumont 999, Independencia ☎ 22978 8000 - www.redcilnica.cl

REGISTRO DE INMUNIZACIONES

	1 ^{era} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{era} dosis	Refuerzo
Hepatitis B	09/11/20	15/12/20	17/05/21	
Influenza				
Otra				