

HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.
- Los efectos secundarios pueden aparecer a las pocas horas e incluso hasta una semana posterior a la colocación de la vacuna.

HORARIO DE ATENCIÓN VACUNATORIO HCUCH

- La persona vacunada debe ingerir abundante líquido.
- Coloque compresas frías (no congeladas) en la zona de punción para ayudar a aliviar el dolor que pudiese presentar.
- En caso de fiebre (temperatura superior a 37,5 °C), administrar antipirético recomendado por su médico tratante.

SOFFA EISA

Was conceptos onelluna.

RUT: 20297644-7

Penulis

HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE

REGISTRO DE INMUNIZACIONES EMPRESAS

C6d.: 73.5829

Santos Dumont 999, Independencia ☎ 22978 8000 - www.redclilnica.cl

REGISTRO DE INMUNIZACIONES

	1 ^{era} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{era} dosis	Refuerzo
Hepatitis B	✓	✓	✓	
Influenza				
Otra				