

CARNÉ DE VACUNACIÓN

Nombre : Javier Vega Ortega

Domicilio : D. Esicho # 610 Paval

Teléfono : 461725 - 73

VACUNA: Twinrix T. (Hepatitis A y B)

	FECHA VACUNACIÓN	PRÓXIMA VACUNACIÓN
PRIMERA DOSIS	<u>21 Febrero 06</u>	<u> </u>
SEGUNDA DOSIS	<u>23 Mayo 06</u>	<u>21 Marzo 06</u>
TERCERA DOSIS	<u>06 Sept 2006</u>	<u>21 Agosto 06</u>
DOSIS DE REFUERZO		

"El intercambio de marcas de vacunas no es recomendable antes de los 15 meses de edad".
(Academia Americana de Pediatría)

En caso de que los sujetos en período de incubación al momento de la vacunación con Twinrix™ Junior no protejan contra la infección provocada por otros virus, como los de la hepatitis E, ni por otros agentes patógenos conocidos para infectar el hígado. Twinrix™ Junior no es recomendado para la profilaxis después de la exposición al virus de la hepatitis C. El uso de la aguja de jeringa).

El uso de Twinrix™ Junior no ha sido probado en sujetos inmunodébil. En los sujetos inmunodébiles, la vacunación con Twinrix™ Junior puede no garantizar la obtención de un nivel adecuado de anticuerpos anti-HAV y anti-HBs. La administración de dosis adicionales del vacuno es a considerar en este caso, pero no se puede garantizar que una respuesta adecuada se obtenga en los sujetos inmunodébiles. En los sujetos inmunodébiles, la administración de Twinrix™ Junior será administrada bajo control médico para observar la respuesta.

En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado. En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado.

En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado. En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado.

Interacción con otros medicamentos y otros vacunos. No se han observado interacciones con otros vacunos. No se han observado interacciones con otros vacunos.

En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado. En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado.

En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado. En caso de reacciones alérgicas graves, Twinrix™ Junior no debe ser administrado.