

Tenga en cuenta que:

Algunas vacunas pueden tener reacciones adversas

- Estas manifestaciones son de corta duración.
- Suelen aparecer a las pocas horas o hasta 10 días después de su administración.
- Se puede producir aumento de volumen y enrojecimiento en el sitio de punción, además de fiebre y malestar general.
- En el caso de la vacuna Trivirica, puede presentarse una leve erupción dérmica tipo Sarampión o Rubéola.

Recomendaciones:

• Dar a tomar bastante líquido - En caso de fiebre sobre 38° dar antipirético indicado por su médico - Colocar compresas frías si existe dolor local.

Programa de vacunación

	RN	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	4 años	T Básico	2° Básico
BCG		07 ABR 2006	07 ABR 2006						
DPT		07 ABR 2006	08 JUN 2006	11 AGO 2006					
Antipolio		07 ABR 2006	08 JUN 2006	11 AGO 2006					
HIB		07 ABR 2006	08 JUN 2006	11 AGO 2006					
Hepatitis B		07 ABR 2006	08 JUN 2006	11 AGO 2006					
Trivirica		07 ABR 2006	08 JUN 2006	11 AGO 2006					
Toxoides DT									

Para los niños nacidos en Circo Aventuroso, la colocación de las vacunas del Programa Nacional y las adicionales, indicadas por su pediatra, son sin costo, durante el primer año de vida.

Vacunas

Vacuna	Enfermedad que previene	Edad de administración
BCG	Tuberculosis	Recién Nacido
DPT	Difteria Tetano Coqueluche	2, 4, 6, 18 meses y 4 años
Antipolio	Parálisis Infantil	2, 4, 6 y 18 meses
HIB	Infecciones por Haemophilus influenzae Tipo B	2, 4 y 6 meses
Hepatitis B	Hepatitis B	2, 4 y 6 meses
Trivirica	Sarampión Paperas Rubéola	12 meses y Traslado
Toxoides DT	Difteria Tetano	2° Básico

DPT escalador
5/1/15

Hepatitis A	1° dosis	10 AGO 2010
Hepatitis A	2° dosis	11 MAR 2011
Hepatitis B	1° dosis	
Hepatitis B	2° dosis	
Hepatitis B	3° dosis	
Hepatitis A y B	1° dosis	
Hepatitis A y B	2° dosis	
Hepatitis A y B	3° dosis	